

Respuestas Alexandre

¿Qué dosis de anestesia da?

- La dosis depende del estado hemodinámico del paciente, los cambios ácido-base y el protocolo elegido.

¿Qué sondas utiliza?

- Sondas de silicona o caucho, de 4Fr de diámetro. Marcas como Mila International y Kruise son interesantes.

¿Qué droga analgésica utiliza?

- La metadona es mi opioide preferido. Para la analgesia en casa, después del alta, me gusta combinar tramadol con gabapentina.

¿Qué usa para relajar la parte estriada de la uretra? ¿Qué dosis?

- No tenemos estudios que demuestren cuáles serían los mejores medicamentos; en teoría, las benzodiazepinas tendrían una buena eficacia, pero ningún estudio clínico lo ha demostrado.

¿Sirve el uso de planta zarzaparrilla? Smilax áspera, vía oral para el cambio de ph de la vejiga?

- El pH no es un punto tan importante como solía ser. Para el tratamiento de la cistitis intersticial, los puntos más importantes son el aumento de la ingesta de agua y la reducción del estrés.

¿Cuáles serían las sondas de látex que hace referencia usa?

- Mila International y Kruise.

¿A utilizado arándanos como ayuda en cistitis?

- No hay recomendación en cistitis intersticial Solo en casos raros de cistitis bacteriana causada por E. Coli

¿Sobre epidural, que volumen de lidocaina inyecta?

- Lidocaína 4 mg / kg con un volumen de 1 ml por cada 4,5 kg de peso

¿Siempre se realiza la cistosentesis antes del sondaje?

- Sí, lo recomiendo antes de la encuesta.

¿Qué pasa con la punción de la cistosentesis si la sonda no pasa?

- Sugiero leer el protocolo U. Of Ohio E. Cooper. Cooper y col. Un protocolo para el manejo de la obstrucción uretral en gatos machos sin cateterismo uretral. JAVMA v 237 (11), pág. 1261-1266, 2010

Respuestas Viviana

¿Qué equipo recomienda para medir la presión?

- Sun Tech oscilometrico y Parks Doppler

¿Cuánto tiempo demanda la presión arterial en un animal tranquilo?

- Mínimo de 10 a 15 minutos

¿Dentro del tratamiento que alimento recomienda?

- No hay una dieta específica para control de Hipertensión Arterial, Si puede recomendarse dietas de acuerdo a que otras comorbilidades tenga el paciente, por ejemplo si es enfermo renal o cardiopatía, o diabetico dietas específicas para mejor manejo de esas enfermedades

¿Si el paciente normaliza su presión arterial, debe continuar con la medicación? O se suspende y se realizan controles?

- Generalmente sucede que cuando logramos que el paciente esté dentro de parámetros normales es con la dosis que está recibiendo del antihipertensivo elegido, por lo cual la medicación no se suspende, si se va controlando y haciendo los ajustes necesarios.

¿Qué opina de los monitores multiparametros para la medición de la presión arterial?

- Se pueden usar pero es para monitoreo del paciente anestesiado, y debe controlarse la presión en esas condiciones a fin de evitar o subsanar cuadros de Hipotensión

¿Cuál sería el fármaco de elección en caso de ser hipertenso, enalapril o cardial?

- El Enalapril es la droga, actualmente el Cardial B contiene Benazepril, ambos son efectivos para el control de la Hipertensión arterial, si el paciente además tiene enfermedad renal se prefiere el Benazepril. AMbas drogas también pueden

disminuir el filtrado por lo cual se recomienda monitorear al paciente en cuanto a su función renal

¿Cómo cobra la medición? Junto con la consulta?

- En mi caso particular es parte de la consulta, no se cobra adicional, salvo que el paciente sea derivado solo para medir la presión arterial, algo que realmente es poco frecuente aún

¿Suele suceder que en felinos con la amlodipinatenga anorexia/vómitos? ¿En ese caso se recomienda usar benazepril?

- No he tenido esa experiencia, en general es bien tolerado

¿Qué opina del equipo contec?

- No es un equipo avalado

¿Cuál recomienda? ¿Suntech o pet map II graphics?

- Personalmente prefiero el Sun Tech, pero uso ambos y a veces me sirven de punto de comparación